

L'athérome : une maladie tumorale ?

Trois séquences d'événements distincts sont associées au développement de la plaque d'athérome : l'accumulation des lipides, la thrombose, la prolifération cellulaire. Jusqu'ici ce sont surtout les deux premiers aspects qui avaient retenu l'attention. L'article que viennent de publier Penn *et al.* [1] donne la vedette à la composante cellulaire en montrant que l'ADN des cellules musculaires lisses des plaques d'athérome possède les mêmes vertus transformantes que celui d'une cellule cancéreuse. Autrement dit, la plaque d'athérome pourrait bien être une minitumeur de la paroi vasculaire. L'origine de ce travail repose sur la découverte en 1973 de l'origine monoclonale de la prolifération de ces cellules, qui sont l'élément cellulaire prédominant dans la plaque d'athérome [2]. Celle-ci apparaissait comme résultant d'un événement mutationnel somatique, viro- ou chimio-induit, survenu dans l'ADN d'une seule cellule. Cette hypothèse devait être par la suite confortée par toute une série de travaux démontrant que l'administration, à des coquelets, d'agents cancérigènes chimiques (diméthylbenzantracène, benzopyrène) ou viraux (virus de Marek) induisait l'apparition de plaques fibro-musculaires sur l'aorte abdominale et thoracique. Il ne restait plus qu'à démontrer que l'ADN des plaques d'athérome avait des propriétés anormales. C'est ce qu'ont fait Penn *et al.* [1] en recourant à la méthodologie désormais classique de la recherche en oncologie moléculaire [3]. Les résultats expérimentaux sont impressionnants : (a) l'ADN des plaques contient des séquences capables de transformer les cellules NIH 3T3 avec une efficacité deux à huit fois supérieure au bruit de fond ; (b) ce pouvoir transformant peut être reproduit lors de cycles de transfection successifs ; (c) l'ADN des cellules transformées corres-

pond bien à l'ADN humain car il hybride avec une sonde de la famille répétitive dispersée Alu ; (d) l'ADN transformant n'hybride avec aucune séquence de la famille des oncogènes *ras* ; (e) l'ADN des cellules transformées est tumorigène chez la souris *nude* ; (f) l'ADN des tumeurs induites chez la souris *nude* hybride avec une sonde Alu humaine. Reste à démontrer que l'activation de l'oncogène mis en évidence par Penn *et al.* [1] dans des plaques d'athérome coronarien est un phénomène primaire, existant dans le tissu de départ, et non un phénomène artéfactuel dû à un réarrangement génique survenant au cours des différentes étapes de la transfection, comme cela s'avère en fait fréquent [4]. Il faut bien dire que les preuves définitives de l'existence de l'oncogène activé dans les cellules musculaires lisses des plaques athéromateuses manquent encore. S'il en était cependant bien ainsi, cela signifierait que le développement de l'athérome comporterait une composante cellulaire — une mutation somatique — dont il resterait alors à apprécier les rapports de causalité ou de coïncidence avec les facteurs prédisposants que sont les habitudes alimentaires et les concentrations relatives des différentes lipoprotéines. L'athérosclérose étant une maladie multifactorielle, on peut concevoir un modèle dans lequel son développement serait le résultat de l'interaction entre deux types de facteurs favorisants : une prédisposition génétique à des mutations somatiques des cellules de la paroi vasculaire d'une part, les anomalies plasmatiques génétiques ou secondaires aux habitudes alimentaires d'autre part. Alternativement, les désordres plasmatiques pourraient être eux-mêmes à l'origine des mutations somatiques activant un « oncogène » de la paroi artérielle.

J.-C. K., A. K.

1. Penn A, Garte SJ, Waren L, Nesta D, Mindich B. Transforming gene in human atherosclerotic plaque DNA. *Proc Natl Acad Sci USA* 1986 ; 83 : 7951-5.
2. Benditt EP, Benditt JM. Evidence for a monoclonal origin of human atherosclerotic plaques. *Proc Natl Acad Sci USA* 1973 ; 70 : 1753-6.
3. Stéhelin D. Les oncogènes cellulaires, clés de la cancérogenèse. *médecine/sciences* 1985 ; 1 : 12-6.
4. Young D, Waitches G, Birchmeier C, Fasano C, Wigler M. Isolation and characterization of a new cellular oncogene encoding a protein with multiple potential transmembrane domains. *Cell* 1986 ; 45 : 711-9.

■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Polyadénylation, coupure endonucléolytique de l'extrémité 3' des transcrits et fin de transcription seraient des phénomènes liés. Un gène d' α globine dont le signal de polyadénylation AATAAA est muté en AATAAC donne des transcrits non polyadénylés et allongés au-delà du site normal de fin de transcription. Ces anomalies entraînent un syndrome α -thalassémique. [Whitelaw E, Proudfoot N. *EMBO J* 1986 ; 5 : 2915-22.]

■■■ Un nouvel exemple de vaccination contre un rétrovirus, le virus de Friend, vient d'être rapporté. Ce rétrovirus provoque une érythroleucémie murine. Des souris vaccinées par un virus de la vaccine recombiné par l'introduction du gène *env* du virus de Friend, codant pour la glycoprotéine de surface, développent une immunité spécifique et sont protégées contre la survenue d'une leucémie après infection par le virus leucémogène. Cette recherche sur les vaccins anti-rétroviraux trouve toute son actualité dans le cadre des efforts actuels pour développer une vaccination efficace contre le SIDA. [Earl PL. *Science* 1986 ; 234 : 728-31.]