

## ■■■ BRÈVES ■■■

chez le rat, obtenus sur la base d'enregistrements électrophysiologiques en présence ou en l'absence de bicuculline. Ces auteurs ont ainsi vérifié que le GABA est bien impliqué dans la délimitation précise des champs récepteurs observés puisque son blocage transitoire provoque l'élargissement de ces champs.

Les systèmes permettant l'expression des mécanismes de neuroplasticité dans le cortex cérébral sont donc progressivement mis en évidence. Les observations rapportées ici et celles présentées par Robert Dykes concourent à démontrer le rôle fondamental de l'acétylcholine comme modulateur, non pas directement de l'activité neuronale, mais de mécanismes d'adaptation de cette activité. Si l'on envisage la neuroplasticité comme un phénomène d'adaptation continu et indispensable du fonctionnement des neurones, ce qui est de plus en plus suggéré, l'acétylcholine apparaît donc ainsi comme un maître d'œuvre privilégié dont toute atteinte — au cours de la maladie d'Alzheimer, par exemple — se traduira par des dysfonctionnements majeurs et multifformes.

M. P.

1. Dykes RW. Acétylcholine et plasticité neuronale du cortex somatosensoriel. *médecine/sciences* 1990 ; 6 : 870-5.

2. Juliano SL, Ma W, Eslin D. Cholinergic depletion prevents expansion of topographic maps in somatosensory cortex. *Proc Natl Acad Sci USA* 1991 ; 88 : 780-4.

3. Merzenich M, Recanzone G, Jenkins WM, et al. Cortical representational plasticity. In : Rakic P, Singer W, eds. *Neurobiology of Neocortex*. New York : Wiley, 1988 : 41-67.

4. Sokoloff L, Reivich M, Kennedy MH, et al. <sup>14</sup>C deoxyglucose method for the measurement of local cerebral glucose utilization : theory, procedure, and normal values in the conscious and anesthetized albino rat. *J Neurochem* 28, 1977 ; 28 : 897-916.

5. Juliano SL, Whitsel BL, Tommerdahl M, Cheema SS. Determinants of patchy metabolic labeling in the somatosensory cortex of cats : a possible role for intrinsic inhibitory circuitry. *J Neurosci* 1988 ; 9 : 1-12.

6. Jacobs KM, Donoghue JP. Reshaping the cortical motor map by unmasking latent intracortical connections. *Science* 1991 ; 251 : 944-7.

*m/s* n° 6, vol. 7, juin-juillet 91

■■■ Régulation négative du récepteur CD4 par le gène *nef* du virus HIV. La protéine Nef du virus HIV jouerait un rôle régulateur négatif sur l'expression du génome viral, rôle encore controversé (*m/s* n° 1, vol. 7, p. 62). Une équipe de Seattle (WA, USA) [1] vient de montrer que l'hyperexpression du gène *nef* conduisait à une régulation négative de l'expression membranaire de la molécule CD4, récepteur principal des virus HIV. Un plasmide permettant l'hyperexpression de ce gène a été introduit dans les lymphocytes T, B et des monocytes, exprimant tous la protéine CD4 à leur surface. L'accumulation de la protéine Nef dans les cellules transfectées s'accompagne d'une forte diminution de CD4 à la membrane cellulaire. Cette régulation négative ne se fait ni au niveau transcriptionnel (il n'y a pas de modification dans l'abondance de l'ARN messager codant pour CD4) ni au niveau traductionnel (la quantité totale de protéine CD4 reste inchangée). L'effet de la synthèse de Nef semble être d'empêcher le transport à la membrane de la protéine CD4, qui est accumulée dans le cytoplasme. Cet effet est indépendant de la phosphorylation de CD4, puisqu'un mutant non phosphorylable de cette protéine subit le même type de régulation par le gène *nef*. Cela signifie que la régulation négative de CD4 par *nef* n'emprunte pas la même voie que celle survenant après traitement par les esters de phorbol, des activateurs de la protéine kinase C. Dans ce dernier cas, en effet, la régulation dépend de la phosphorylation de CD4 et est abolie en cas de mutation des résidus sérine phosphorylables. Alors qu'on ne sait toujours pas si le gène *nef* est vraiment un régulateur négatif de l'expression du génome viral, ces résultats démontrent qu'il pourrait jouer un rôle dans la pathogénicité du virus, en diminuant l'expression de la protéine CD4, molécule d'adhérence jouant un rôle important dans la réponse immunitaire. La disparition des cellules CD4, caractéristique des stades avancés du

SIDA, pourrait ainsi être secondaire, tout à la fois, à un processus de lyse cellulaire et à une inhibition de l'expression membranaire de la molécule CD4.

[1. Garcia VJ, Miller AD. *Nature* 1991 ; 350 : 508-11.]

■■■ Création d'un rein de mammifère chimérique fonctionnel. Plusieurs études ont montré que des cellules infectées par des rétrovirus, surexprimant certains gènes spécifiques, pouvaient être intégrées dans divers organes. L'architecture du rein est très complexe, faite notamment d'interrelations entre des structures vasculaires et des néphrons. On pouvait penser que ce type d'intégration serait impossible. C'est néanmoins ce qu'ont réalisé A. S. Woolf et al. [1] (UCLA, USA, et University College, Londres, GB). Ils ont utilisé du rein embryonnaire, au stade de métanéphros, provenant soit de la lignée 83 de souris, transgénique (possédant de multiples copies du gène de la  $\beta$ -globine), soit de la lignée de souris beige dont beaucoup de cellules (parmi lesquelles les cellules tubulaires proximales rénales) contiennent des lysosomes géants facilement identifiables. Le fragment de métanéphros prélevé a été implanté dans le cortex rénal de souris nouveau-nées ; dans cette espèce, la néphrogenèse se prolonge dans la période post-natale. Le taux de survie des souris est de 50 % et l'implantation n'est couronnée de succès que chez moins de 50 % des survivants. L'intégration anatomique du métanéphros implanté est démontrée par hybridation *in situ* pour l'ADN de la  $\beta$ -globine ou par détection des lysosomes géants. Dans deux reins chimériques, les auteurs ont pu démontrer que du dextran marqué à la fluorescéine, injecté par voie intraveineuse se retrouvait dans les lumières de tubes proximaux, suggérant l'ultrafiltration du marqueur à travers les glomérules et la connexion entre des glomérules fonctionnels filtrants et des tubes proximaux.

[1. Woolf AS, et al. *Kidney Int* 1990 ; 38 : 991-7.]