

4. Biancalana V, Briard ML, David A, Gilgenkrantz S, Kaplan J, Mathieu M, Piussan C, Poncin J, Schinzel A, Oudet C, Hanauer A. Confirmation and refinement of the genetic localization of the Coffin-Lowry syndrome locus in Xp22.1-p22.2. *Am J Hum Genet* 1992; 50: 981-7.

5. Biancalana V, Trivier E, Weber C, Weissenbach J, Rowe PSN, O'Riordan JLH, Partington MW, Heyberger S, Oudet C, Hanauer A. Construction

of a high-resolution linkage map for Xp22.1-p22.2 and refinement of the genetic localization of the Coffin-Lowry syndrome gene. *Genomics* 1994; 22: 617-25.

6. Trivier E, De Cesare D, Jacquot S, Pannetier S, Zackai E, Young I, Mandel JL, Sassone-Corsi P, Hanauer A. Coffin-Lowry syndrome is caused by mutations in the growth-factor activated RSK2 kinase. *Nature* 1996; 384: 567-70.

7. Moller DE, Xia CH, Tang T, Zhu A, Jakubowsky

M. Human RSK isoforms: cloning and characterization of tissue-specific expression. *Am J Physiol* 1994; 266: C351-9.

8. Blenis J. Signal transduction via the MAP kinases: proceed at your own RSK. *Proc Natl Acad Sci USA* 1993; 90: 5889-92.

9. Xing J, Ginty DD, Greenberg ME. Coupling of the RAS-MAPK pathway to gene activation by RSK2, a growth factor-regulated CREB kinase. *Science* 1996; 273: 959-63.

■■■■ BRÈVES ■■■■

■■■■ **Effets toxiques de l'oxygène, maladie d'Alzheimer et apolipoprotéine E.** Nous avons rapporté très récemment que le peptide β -amyloïde pouvait se lier à des récepteurs membranaires et entraîner un stress oxydatif avec production de radicaux libres de l'oxygène (*m/s n° 11, vol. 12, p. 1262*). Par ailleurs, la corrélation entre la susceptibilité à la maladie d'Alzheimer et les allèles de l'apolipoprotéine E exprimés est connue depuis plusieurs années (*m/s n° 10, vol. 9, p. 1142*). L'apolipoprotéine E2 semble être plutôt protectrice (*m/s n° 8/9, vol. 10, p. 920*) alors que l'apolipoprotéine E4 est clairement un important facteur de susceptibilité (*m/s n° 4, vol. 10, p. 470*). Par conséquent, il était logique de se poser la question d'un éventuel effet protecteur des allèles de l'apolipoprotéine E vis-à-vis des lésions oxydatives. Miyata et Smith, de New York (USA), ont spécifiquement étudié cette question [1]. Ils montrent que les allèles de cette apolipoprotéine sont, en effet, plus ou moins efficaces pour protéger les cellules des lésions provoquées par l'ajout d'eau oxygénée. L'effet protecteur est maximal pour l'allèle E2, moindre pour E3 et minimal pour E4 [1]. Le même effet est retrouvé en ce qui concerne la protection contre la cytotoxicité du peptide β -amyloïde. Par ailleurs, il est montré que les apolipoprotéines E sont capables de fixer des cations métalliques (Cu^{2+} , Fe^{3+} , Fe^{2+} , Zn^{2+}), ce qui pourrait rendre compte de leur effet anti-oxydant. Cependant, aucun des auteurs n'a pu démontrer de différence dans l'affinité des allèles de

l'apoE pour ces cations métalliques. Naturellement, cette étude n'établit qu'une corrélation entre l'effet anti-oxydant des allèles de l'apoE et leur effet plus ou moins protecteur vis-à-vis du développement de la maladie d'Alzheimer, sans démontrer le lien de cause à effet. Cependant, les arguments convergents en faveur de l'intervention de mécanismes de toxicité oxydative dans les lésions de la maladie d'Alzheimer rendent cette corrélation extrêmement suggestive.

[1. Miyata M, Smith JD. *Nature Genet* 1996; 14: 55-61.]

■■■■ **Rythmes et émotions sous la coupe des récepteurs histaminiques H1?** Distinguer le rôle propre d'un récepteur lorsqu'il en existe différents sous-types et élucider sa fonction spécifique au niveau du système nerveux central sont deux objectifs particulièrement ambitieux. Cela est devenu possible grâce à la stratégie d'inactivation génique, comme le montre l'exemple du récepteur H1 de l'histamine [1]. Outre son rôle dans l'inflammation et la sécrétion gastrique acide, l'histamine, du fait de sa localisation neuronale cérébrale, exerce un rôle modulateur important au niveau du système nerveux central. Aujourd'hui, en invalidant chez la souris le gène codant pour le récepteur H1, un des trois sous-types de récepteurs histaminiques connus [2], un rapport japonais nous révèle l'importance de ce récepteur sur le comportement, tant au niveau de

l'activité locomotrice que de l'émotivité. Si les souris dépourvues de récepteurs H1 n'ont aucune anomalie anatomique détectable, elles présentent, en revanche, une perturbation importante du rythme de leur activité locomotrice: au cours du cycle jour/nuit classique (12 heures/12 heures), ont été enregistrées à la fois une nette augmentation de l'activité locomotrice dans la période de jour, et une diminution durant la phase nocturne. En outre, le rapport activité diurne/activité nocturne, comparé à celui des souris témoins, devient plus important chez les souris mutées. L'émotivité des souris est, elle aussi, mise à l'épreuve par l'inactivation du gène du récepteur H1. Dans une situation de stress, les signes émotionnels (miction, défécation, immobilisation) sont amplifiés chez les souris mutées. Placées dans un nouvel environnement, leur comportement explorateur est profondément altéré: alors que les mouvements moteurs réflexes restent coordonnés, la surface explorée et les temps d'exploration s'avèrent sensiblement diminués. L'ensemble de ces résultats mettent en lumière l'influence du système histaminergique cérébral relayé par les récepteurs histaminiques H1 sur le rythme jour/nuit des activités locomotrices et sur le contrôle émotionnel, deux composantes essentielles du comportement.

[1. Inoue I, et al. *Proc Natl Acad Sci USA* 1996; 93: 13316-20.]

[2. Devillier P, et al. *Med Sci* 1989; 5: 408-14.]