

loppement embryonnaire et la morphogénèse, est altéré dans les leucémies à promyélocytes (*m/s n° 8, vol. 6, p. 814*). Ces résultats illustrent les multiples interactions entre la prolifération, la différenciation et l'oncogénèse, les gènes initialement caractérisés par leur intervention à l'un de ces niveaux ayant toutes les chances d'influer aussi sur les deux autres.

#### A. K.

1. Birkenmeier EH, Gwynn B, Howard S, *et al.* Tissue-specific expression, developmental regulation, and genetic mapping of the gene encoding CCAAT/enhancer binding protein. *Genes Dev* 1989 ; 3 : 1146-56.
2. Friedman AD, Landschulz WH,

McKnight SL. CCAAT/enhancer binding protein activates the promoter of the serum albumin gene in cultured hepatoma cells. *Genes Dev* 1989 ; 3 : 1314-22.

3. Christy RJ, Yang VW, Ntambi JM, *et al.* Differentiation-induced gene expression in 3T3-L1 pre-adipocytes : CCAAT/enhancer binding protein interacts with and activates the promoter of two adipocytes-specific genes. *Genes Dev* 1989 ; 3 : 1323-35.

4. Mueller C, Maire P, Schibler U. DBP, a liver-enriched transcriptional activator is expressed late in ontogeny and its tissue specificity is determined post-transcriptionally. *Cell* 1990 ; 61 : 279-91.

5. Descombes P, Chojkier M, Lichsteiner S, Falvey E, Schibler U. LAP, a novel member of the C/EBP gene family, encodes a liver-enriched transcriptional activator protein. *Genes Dev* 1990 ; 4 : 1541-51.

6. Akira S, Isshiki H, Sugita T, *et al.* A nuclear factor for IL-6 expression (NF-IL-6)

is a member of a C/EBP family. *Embo J* 1990 ; 1897-990.

7. Poli V, Mancini FP, Cortese R. IL-6DBP, a nuclear protein involved in interleukin 6 signal transduction, defines a new family of leucine-zipper proteins related to C/EBP. *Cell* 1990 ; 63 : 643-53.

8. Roman C, Platero S, Shuman J, Calame K. Ig/EBP1 : a ubiquitously expressed immunoglobulin enhancer binding protein that is similar to C/EBP and heterodimerizes with C/EBP. *Genes Dev* 1990 ; 4 : 1404-15.

9. Landschulz WH, Johnson PF, McKnight SL. The DNA binding domain of the rat liver nuclear protein C/EBP is bipartite. *Science* 1989 ; 243 : 1681-8.

10. Umek RM, Friedman AD, McKnight SL. CCAAT/enhancer binding protein : a component of differentiation switch. *Science* 1991 ; 251 : 288-92.

11. Alonso S. Des facteurs de régulation spécifiques de la myogénèse. *médecine/sciences* 1990 ; 6 : 635-45.

## ■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Un gène pour le syndrome de Turner : une piste à suivre. Le syndrome de Turner associe une petite taille, une dysgénésie gonadique ainsi qu'un ensemble dysmorphique et malformatif complexe. La formule caryotypique généralement retrouvée dans ce syndrome est (45, XO) ou monosomie X. Ferguson-Smith avait, dès 1965, émis l'hypothèse que le syndrome de Turner était dû à la perte d'un ou de plusieurs gènes commun(s) à X et à Y. Un ou de tels gènes se devaient alors d'échapper à l'inactivation d'X. Par la suite, différentes observations de phénotype turnérien à caryotype (46, XY) avec remaniement délétionnel complexe du Y ont permis de circonscrire sur ce chromosome une région minimale de 90 kilobases susceptible de contenir un tel gène. C'est en clonant cette région que l'équipe de D. Page vient de mettre en évidence un gène susceptible de répondre à ces différents critères. L'analyse de la séquence codante révèle une protéine de 263 acides

aminés dont l'homologie avec la protéine ribosomique S4 (une des protéines de la petite sous-unité ribosomique) du rat atteint 93 %. Une isoforme de cette protéine ribosomale du Y (RPS4Y) est également portée par le chromosome X (RPS4X), avec, cependant, une divergence de la séquence codante sur 19 acides aminés. L'expression, analysée sur le plan transcriptionnel, paraît ubiquitaire (un transcrit de 1 kb est détecté dans toutes les lignées et tous les tissus examinés) et, surtout, elle est indépendante du statut actif ou inactif du X qui porte ce gène. Si les critères attendus pour un tel gène, à savoir sa localisation sur l'Y et le fait qu'il échappe à l'inactivation, en font un bon candidat, en revanche sa localisation sur le bras long du chromosome X en Xq13.1 est beaucoup plus surprenante. En effet, les gènes échappant à l'inactivation décrits jusqu'ici étaient tous localisés sur l'extrémité du bras court du chromosome X. La découverte de deux gènes codant pour une protéine ribo-

somique, situés l'un sur le chromosome Y et l'autre sur l'X, est en soi originale, mais leur intervention dans le syndrome de Turner reste encore à démontrer. En effet, la monosomie de RPS4 n'est sans doute pas, à elle seule, responsable de l'ensemble du phénotype clinique, celui-ci étant parfois rencontré en cas de délétion limitée au bras court du chromosome X. Beaucoup de questions sont encore non résolues. Il reste notamment à élucider les mécanismes qui président à l'échappement de certains zygotes porteurs d'un caryotype (45, XO) à la létalité, largement majoritaire dans ce type d'anomalie chromosomique. De même, la différence de séquence entre l'ADNc porté par l'X et celui porté par l'Y est-elle responsable d'une différence fonctionnelle des produits protéiques pour lesquels ils codent ? Affaire à suivre...

[1. Ferguson-Smith MA, *et al.* *J Med Genet* 1965 ; 2, 142-55.]

[2. Fisher EM, *et al.* *Cell* 1990 ; 63 : 1205-8.]

■■■ **Pouvoir transformant des gènes homéotiques.** Les gènes homéotiques — d'abord décrits chez la drosophile, où leur altération modifie le schéma de développement de la mouche — sont caractérisés par la présence d'un domaine protéique de fixation à l'ADN, très conservé au cours de l'évolution, et qui porte le nom de « boîte homéo ». Chez la souris, une famille d'homéogènes appelés Hox a été identifiée par criblage à l'aide des sondes correspondant aux gènes de drosophile. L'analyse de la régulation de l'expression de ces gènes au cours du développement de la souris a permis de suggérer que le système nerveux central des mammifères pouvait être divisé en domaines dessinés par le profil d'expression des gènes homéotiques [1]. De tels gènes, codant pour des facteurs transcriptionnels, impliqués dans le contrôle du développement, pouvaient être considérés comme des oncogènes potentiels. Le potentiel oncogénique du gène *Hox-2.4* vient d'être confirmé par Aberdam D. de l'Institut Weizmann (Israël) [2]. Dans une première série d'expériences, la même équipe avait recherché des perturbations de gènes homéotiques au sein de tumeurs murines et identifié, dans des cellules leucémiques, un réarrangement du gène *Hox-2.4* induit par l'insertion d'une séquence IAP (*intracisternal A particle*). Ce réarrangement a pour conséquence l'expression d'un transcrite *Hox-2.4* anormal dans des cellules qui n'expriment normalement pas le gène *Hox-2.4* [3, 4]. Pour démontrer l'implication directe de cette séquence dans la transformation, les auteurs ont cloné le gène *Hox-2.4* réarrangé (*IAP-Hox-2.4*) et l'ont introduit par transfection dans des fibroblastes NIH 3T3. Transférés chez la souris nude, les fibroblastes exprimant le gène *IAP-Hox-2.4* sont à l'origine de tumeurs plus ou moins agressives selon le point d'injection. Ainsi, le potentiel oncogénique de gènes homéotiques activés est-il démontré. Chez l'homme, l'analyse moléculaire d'une translocation t(1; 19) dans des cellules pré-B d'une leu-

cémique lymphoblastique aiguë provoque un réarrangement du gène homéotique *prl* (*m/s*, n° 5, vol. 6, p. 489). Ainsi, les gènes homéotiques peuvent être ajoutés à la liste déjà longue des oncogènes potentiels.

- [1. Tuggle CK, *et al. Genes Dev* 1990 ; 4 : 180-9.]
- [2. Aberdam D, *et al. Mol Cell Biol* 1991 ; 11 : 554-7.]
- [3. Blatt C, *et al. EMBO J* 1988 ; 7 : 4283-90.]
- [4. Kongsuwan K, *et al. Nucleic Acids Res* 1989 ; 17 : 1881-92.]

■■■ **Inactivation par double recombinaison homologue des deux allèles du gène *pim-1*.** Pour étudier, *ex vivo*, les conséquences phénotypiques de la non-expression d'un gène, des modèles cellulaires dérivés de souris transgéniques homozygotes dans lesquelles le gène à inactiver a été remplacé par le transgène peuvent être utilisés. La méthodologie récente, mais déjà classique, pour obtenir le remplacement des deux allèles d'un gène par une séquence exogène, repose sur la recombinaison homologue dans les cellules embryonnaires, entre l'un des allèles du gène à inactiver et le transgène. L'insertion par recombinaison homologue étant chez les mammifères beaucoup moins fréquente que l'intégration au hasard, il est nécessaire de sélectionner et de reconnaître les cellules dans lesquelles elle s'est produite [1]. Pour ce faire, les transgènes introduits comportent souvent, outre les séquences homologues à cibler, des gènes de sélection, l'un permettant de trier les cellules ayant intégré le transgène et l'autre permettant d'éliminer les cellules ayant fait l'objet d'une intégration au hasard. Les cellules embryonnaires recombinées, introduites dans des blastocystes, vont participer à la constitution de chimères constituées de cellules normales et de cellules recombinées. Lorsque ce chimérisme atteint les cellules germinales, des descendants transgéniques dont toutes les cellules comportent le transgène et l'allèle normal peuvent être produits. Par

croisement, des animaux homozygotes pour le transgène, n'ayant donc plus d'allèle normal, sont obtenus, à partir desquels des modèles cellulaires sont dérivés. Une stratégie plus directe, fondée sur l'inactivation séquentielle de l'un puis de l'autre allèle du gène ciblé vient d'être appliquée au gène *pim-1* par Hein te R *et al.* du *Netherlands Cancer Institute* (Amsterdam). Pour ce faire, un premier transgène — comportant le gène de résistance à la néomycine (*néo*) placé au sein de la séquence *pim-1* de telle sorte qu'il ne puisse fonctionner que lorsque le transgène est intégré à la place du gène endogène *pim-1* (*pim-1/néo*) — est utilisé. Dans les cellules résistantes à la néomycine, obtenues après transfert du gène *pim-1/néo*, un second transgène — comportant, à la place du gène *néo*, le gène de résistance à l'hygromycine (*pim-1/hyg*) — est ensuite introduit. La sélection par l'hygromycine B permet alors de sélectionner les cellules dont le second allèle *pim-1* a été remplacé par le transgène *pim-1/hyg*. Les auteurs ont ainsi sélectionné des cellules ES *pim-1/néo*, *pim-1/hyg* qui n'ont plus de gène *pim-1* normal. L'absence de la protéine Pim-1 dans les cellules ES où elle est normalement synthétisée en abondance ne provoque pas de perturbations majeures de leur phénotype *in vitro*, permettant de formuler trois hypothèses : (1) il existerait, au cours du développement, une redondance de l'information, la fonction d'une protéine manquante pouvant être suppléée par une autre protéine ; (2) la protéine éliminée jouerait un rôle dans des conditions bien particulières auxquelles les cellules ES analysées *in vitro* n'auraient pas été soumises ; (3) la protéine Pim-1 interviendrait dans une cascade de régulations et de fonctions dont les anomalies ne seraient détectables qu'à un stade ultérieur, inaccessible à l'analyse *in vitro*.

- [1. Lemarchandel B, *et al. médecine/sciences* 1990 ; 6 : 18-29.]
- [2. Hein te R, *et al. Nature* 1990 ; 348 : 649-51.]



■■■ **Déficit partiel du transporteur de glucose GLUT-2 dans un modèle animal de diabète non insulino-dépendant.** Il existe plusieurs types de transporteurs de glucose, plus ou moins spécifiques de tissus et répondant, ou non, à l'insuline [1]. Dans le foie et les cellules  $\beta$  des îlots de Langerhans du pancréas se trouve le transporteur GLUT-2, à haute constante de Michaelis (10 mM), qui assure un équilibre entre le glucose extra- et intracellulaire, le transport étant grossièrement proportionnel à la glycémie [2]. Les cellules  $\beta$  langerhansiennes du rat Zucker, qui constitue un modèle de diabète non insulino-dépendant associé à une résistance à l'insuline et à une obésité, ont une densité extrêmement faible de molécules GLUT-2 [3], qui provoque probablement leur insuffisance de réponse sécrétoire insulinoïque au glucose. Il vient maintenant d'être démontré par des équipes suisse (Genève) et américaines (Indianapolis, IN, et Dallas, TX) que cette insuffisance d'expression de la protéine GLUT-2 préexistait chez le rat Zucker à toute hyperglycémie, et ne pouvait donc être attribuée à une glucotoxicité comme d'autres anomalies de ce type de diabète [4]. Sans que le mécanisme du déficit partiel de GLUT-2 soit à cette heure connu, il pourrait s'agir là d'un désordre causal dans l'apparition du diabète. En effet, l'insulinosécrétion de la cellule  $\beta$  langerhansienne est normalement contrôlée par la concentration de glucose extracellulaire, en équilibre grâce à GLUT-2 avec le glucose intracellulaire. Ce sucre, une fois entré dans la cellule, est métabolisé après avoir été phosphorylé par la glucokinase, ce qui conduit à la production d'énergie stockée sous forme d'ATP. L'ATP agit alors sur des canaux  $K^+$  sensibles à ce trinucleotide, qui sont fermés, entraînant une dépolarisation membranaire et l'ouverture de canaux calciques dépendants du voltage [5]. La sécrétion d'insuline serait secondaire à l'augmentation de la concentration

cytosolique du  $Ca^{2+}$ . Une diminution de l'efficacité de la première étape, l'entrée du glucose, peut donc expliquer la résistance au glucose de la cellule  $\beta$  langerhansienne, l'insuffisance de la sécrétion d'insuline et l'hyperglycémie qui pourrait à son tour, par le mécanisme de la glucotoxicité évoqué plus haut, aboutir à la résistance à l'insuline [6].

- [1. Assimacopoulos F, Jeanrenaud B. *médecine/sciences* 1989 ; 5 : 32-41.]
- [2. Thorens B, *et al. Cell* 1988 ; 55 : 281-90.]
- [3. Johnson JH, *et al. Science* 1990 ; 250 : 546-9.]
- [4. Orci L, *et al. Proc Natl Acad Sci USA* 1990 ; 87 : 9953-7.]
- [5. Lazdunski M. *médecine/sciences* 1990 ; 6 : 279-85.]
- [6. Portha B. *médecine/sciences* 1991 ; 7 : 212-25.]

■■■ **Contrôle du sexe de l'enfant à naître.** Du régime alimentaire précédant la fécondation aux tentatives diverses de fractionnement des spermatozoïdes, nombreuses sont les méthodes qui ont été rapportées comme étant capables de maîtriser le sexe des embryons, c'est-à-dire la nature du spermatozoïde fécondant. Ces derniers diffèrent en effet selon qu'ils contiennent un chromosome Y ou un chromosome X, les premiers aboutissant à un embryon mâle et les seconds à un embryon femelle. Jusqu'à présent, cependant, aucune technique de fécondation avec contrôle du sexe n'a jamais donné significativement plus de 50 % de succès... C'est sur des bases totalement nouvelles que reposent deux brevets récemment déposés par des sociétés américaines, l'une gouvernementale (le département du Commerce) et l'autre privée, Cytogam, de Chandler en Arizona. Le principe du tri de spermatozoïdes selon le sexe que décrivent ces brevets est leur marquage par un fluorochrome vital de type benzimide, puis leur séparation en trieur de cellules (cytométrie en flux, *m/s n° 10, vol. 6, p. 1000*). Les

spermatozoïdes X sont légèrement plus fluorescents que les spermatozoïdes Y, et peuvent ainsi être séparés de ces derniers. Les premiers essais de ces méthodes chez l'animal (lapins et porcs) seraient extrêmement encourageants. Cytogam a aussi développé d'autres approches, complémentaires ou alternatives du tri en cytométrie de flux. Il existe des « protéines associées au sexe » à la surface des spermatozoïdes qui sont spécifiques des gamètes mâles ou femelles. Des anticorps appropriés ont été développés qui, ajoutés au sperme, inactivent la classe de spermatozoïdes contre laquelle ils sont dirigés, augmentant ainsi la chance d'obtenir, après fécondation, des embryons du sexe désiré. On peut même envisager d'immuniser des animaux femelles contre ces antigènes, créant ainsi des génitrices exclusives de descendants d'un sexe. Toutes ces nouveautés ont un grand intérêt dans le domaine de l'élevage. Appliquées à l'espèce humaine, elles soulèvent bien évidemment de très importantes questions éthiques qu'il ne faudra pas éluder. Cette application à l'homme pourrait d'ailleurs être assez difficile, la différence entre les masses d'ADN des spermatozoïdes mâles et femelles étant moins importante que chez les animaux domestiques (2,9 % dans le premier cas, de 3 à 4,5 % dans le second). Les familles à risque pour des maladies liées à au X (myopathie du Duchenne, hémophilie, par exemple) représentent de possibles indications d'une fécondation artificielle après tri de spermatozoïdes.

[Fox B, Joyce C. *New Scientist* 12 janvier 1991, 23.]

■■■ **Un ADN monocaténaire détecté par microscopie électronique dans le cerveau d'animaux atteints de tremblante.** La cause des encéphalopathies spongiformes — représentées typiquement par la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme et par la tremblante (scrapie) chez les animaux — reste incon-