

rents), l'idée d'un modèle simple de transmission mendélienne est remise en cause et, dans ces conditions, est-il raisonnable de continuer à rechercher et à publier de nouveaux locus ? A défaut d'autres pistes, et même si le mode de transmission est plus complexe qu'on ne l'imaginait, il n'est pas inutile d'établir une carte d'exclusion et de vérifier si tel *locus* répond au mode de transmission de certaines familles, qui pourraient ainsi former des sous-groupes, dans l'attente du premier gène prédisposant qui nous éclairerait enfin sur un des mécanismes pathogéniques de cette maladie dévastatrice pour les malades (on compte 10 % à 20 % de suicides dans les cas non traités) et pour leur famille.

**S.G.**

1. Reich T, Clayton PJ, Winokar G. Family history studies: V The genetics of mania. *Am J Psychiatr* 1969; 125 : 1358-69.

2. Mendlewicz J, Fleiss JL, Fieve RR. Evidence for X-linkage in the transmission of manic-depressive illness. *J Am Med Ass* 1972; 222: 1624-7.  
 3. Mendlewicz J, Rainer JD. Morbidity and genetic transmission in manic depressive illness. *Am J Hum Genet* 1974; 26: 692-701.  
 4. Baron M. Genetic linkage between X-chromosome markers and bipolar affective illness. *Nature* 1987; 326: 289-92.  
 5. Baron M, Freimer NB, Risch N, Lerer B, Alexander JR, Straub RE, Asokan S, et al. Diminished support for linkage between manic depressive illness and X chromosome markers in three Israeli pedigrees. *Nature Genet* 1993; 3: 49-55.  
 6. Egeland JA. Bipolar affective disorder linked to DNA markers on chromosome 11. *Nature* 1987; 325: 783-7.  
 7. Ginns EI, Ott J, Egeland JA, Allen CR, et al. A genome-wide search for chromosomal loci linked to bipolar affective disorder in the Old Order Amish. *Nature Genet* 1996; 12: 431-4.  
 8. Pekkarinen P, Terwilliger J, Bredbacka PE, Lonnquist J, Pettonen L. Predisposition to bipolar disorder in the genetic isolate of Eastern Finland. *Psychiatr Genet* 1995; 5: S26.  
 9. Freimer NB, Reus VI, Escamilla MA, McInnes LA, et al. Genetic mapping using haplotype, association and linkage methods suggests a locus for severe bipolar disorder (BPI) at 18q22-q23. *Nature Genet* 1996; 12: 436-41.  
 10. Blackwood DHR, He L, Morris S, McLean A, Whitton C, et al. A locus for bipolar affective

disorder on chromosome 4p. *Nature Genet* 1996; 12: 427-30.  
 11. Stine OC, Xu J, Koskela R, McMahon FJ, Gschwend M, et al. Evidence for linkage of bipolar disorder to chromosome 18 with a parent-of-origin effect. *Am J Hum Genet* 1995; 57: 1384-94.  
 12. Risch N, Botstein D. A manic depressive history. *Nature Genet* 1996; 12: 351-3.  
 13. Coon H, Jensen S, Hoff M, Holik J, Plaetke R, Reimherr F, Wender P, Leppert M, Byerley W. A genome-wide search for genes predisposing to manic-depression, assuming autosomal dominant inheritance. *Am J Hum Genet* 1993; 52: 1234-49.  
 14. Craddock N, Owen M, Burge S, Kurian B, Thomas P, et al. Familial cosegregation of major affective disorder and Darier's disease (keratosis follicularis). *Br J Psychiatry* 1994; 164: 355-8.  
 15. Berettini WH, Ferraro TN, Goldin LR, Weeks DE, Detera-Wadleigh S, et al. Chromosome 18 DNA markers and manic depressive illness: evidence for a susceptibility gene. *Proc Natl Acad Sci USA* 1994; 91: 5918-21.  
 16. Ewald H, Mors O, Flint T, Koed K, Eiberg H, Kruse TA. A possible locus for manic depressive illness on chromosome 16p13. *Psychiatr Gen* 1995; 5: 71-81.  
 17. Mendlewicz L, Simon P, Sevy S, Charon F, Brocas H, Legros S, Vassart G. Polymorphic DNA marker on X chromosome and manic depression. *Lancet* 1987; 1: 1230-2.

## ■■■■ BRÈVES ■■■■

■■■■ **De plus en plus fort : une spermatogenèse xénogénique.** Nous avons rapporté en 1994 l'exploit de l'équipe de Ralph Brinster (Philadelphie, PA, USA) qui était parvenue à repeupler des testicules de rongeurs stérilisés par un traitement au busulfan (misulban) à l'aide de spermatozoïdes préparées à partir d'un donneur sain (*m/s n° 12, vol. 10, p. 1353*). L'équipe de Ralph Brinster discutait l'intérêt d'une telle technique pour repeupler les testicules de malades stérilisés à la suite d'une chimiothérapie anticancéreuse et évoquait même la possibilité d'une thérapie génique germinale. Dans de nouvelles expériences, David Clouthier et al. ont greffé dans les testicules de souris immunodéprimées (souris *Scid* ou souris *nude*) des spermatozoïdes provenant de testicules de rat transgénique exprimant une construction dans laquelle le gène *lac Z* est placé sous le contrôle du promoteur du gène de la métallo-

thionéine 1 [1]. Cette construction permet de colorer en bleu les cellules de Sertoli et les cellules germinales dans lesquelles elle s'exprime. Une spermatogenèse de rat peut être observée dans certains tubes séminifères de souris, aboutissant, quoique rarement, à la formation de spermatozoïdes mûrs. A noter que les cellules de Sertoli observées ne dérivent pas du donneur, et n'expriment ainsi pas le gène *lac Z*, contrairement aux cellules germinales de rat. Au-delà du spectaculaire exploit technique que constitue cette expérience, qui n'apporte pas grand-chose de plus au point de vue théorique que les expériences antérieures, à quoi pourrait bien servir une telle utilisation de la spermatogenèse xénogénique ? Les auteurs proposent que des testicules de souris immunodéprimées traitées au busulfan pourraient être utilisées pour provoquer la maturation de spermatozoïdes prélevées à partir de mâles

de grande valeur mais stériles. Le faible rendement de la production de spermatozoïdes ne décourage pas les auteurs qui rappellent qu'une grossesse peut être provoquée par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes [2]. Après l'ICSI (*intracytoplasmic sperm injection*) utilisant des gamètes immatures, les auteurs nous annoncent-ils la même opération avec des gamètes humains dont la maturation à partir d'un précurseur aurait été provoquée dans un testicule hôte animal ? Nous n'avons probablement pas fini d'entendre parler de la gymnastique procréative que pourrait autoriser la combinaison de la culture cellulaire, de la spermatogenèse xénogénique et de la fécondation par ICSI !

[1. Clouthier DE, et al. *Nature* 1996; 381: 418-21.]

[2. Testart J. *médecine/sciences* 1995; 11: 447-53.]